AMINOTERAPIA®

L-Cistina

Comprimidos recubiertos

Industria Argentina — Venta bajo receta

FÓRMULA:
Cada comprimido contiene:
L-Cistina 250 mg, Gelatina Soluble 100 mg, Povidona 14 mg, Croscarmelosa Sódica 12 mg, Lactosa/Crospovidona/Povidona 12 mg, Dióxido de Silicio Coloidal 8 mg, Estearato de Magnesio 4 mg, Alcohol Polivinílico/Dióxido de Titanio/Polietilenglicol 4000/Talco/ Rojo Allura laca 13 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Aporte de aminoácidos indispensables para la síntesis de la queratina.
Estimula el crecimiento del cabello y las uñas.

INDICACIONES:
Tratamiento coadyuvante en conjunto con el tratamiento específico en estados de fragilidad capilar y ungueal.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
La L-Cistina estimula el proceso de queratinización, al aumentar el sustrato disponible para la síntesis de queratina por la provisión de grupos sulfhídricos, que serían incorporados a las proteínas fibrosas durante la fase de queratinización en pelos y en uñas.
La L-Cistina es un aminoácido que forma gran cantidad de las unidades estructurales de las proteínas en el organismo, especialmente la queratina de la piel y de faneras. La cutícula del pelo contiene una alta proporción de Cisteína y la corteza del pelo tiene un 40% de proteínas ricas en sulfuros.

FARMACOCINÉTICA:
La absorción de L-Cistina se realiza a nivel intestinal. Luego se distribuye por todos los tejidos del organismo presentando su mayor incorporación en la piel y faneras (cabellos y uñas).
La mayores concentraciones aparecen en el cabello entre las 4 y 6 semanas después de su administración.
Se metaboliza principalmente en hígado y se incorpora a las proteínas orgánicas. Su eliminación es por las heces y la orina.

POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN:
La dosis y duración del tratamiento se determina según criterio médico.
Se sugiere la ingesta de 3 a 4 comprimidos diarios.
Ingerirlos preferentemente antes de alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena) y por un periodo no menor a 3 meses.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
No administrar en caso de cistinuria.

PRECAUCIONES:
No se ha descripto interacciones con otras drogas.
No usar en caso de insuficiencia renal o hepática severa.
En pacientes con diabetes mellitus y en aquellos con lesión hepatocelular sospechosas, se pueden incrementar los cuerpos cetónicos.

REACCIONES ADVERSAS:
La seguridad y eficacia en niños no han sido establecidas.
No se han descripto reacciones adversas en mujeres embarazadas y o en período de lactancia.

SOBREDOSIFICACIÓN:
Aún no se han reportado casos de sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros toxicológicos.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-2247 / 6666.
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 30, 90 y 120 comprimidos.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura ambiente, menor a 30°C.

Mantener éste, como todos los medicamentos, fuera del alcance de los niños.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 41.175

Fecha de última revisión: 4/2/08 - Disposición Nº 0585

Megalabs
Megalabs Argentina S.A.U.
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico

medihealth

2005120112 A